



## Bartholins cyste/byld

### Årsag:

Bartholins kirtler er to små kirtler bagtil i de små kønslæber. Hvis udførselsgangen fra en sådan kirtel tilstoppes, vil der ophobes slim i kirtlen og der vil opstå en bule/cyste. Der kan gå betændelse i en sådan cyste, og der vil udvikles en byld. Det skyldes ikke dårlig hygiejne.

### Symptomer:

En Bartholins cyste kan genere ved f.eks. cykling og samleje eller give smerter pga. spændingen i cysten. Udvikles der en byld, vil der være rødme, hævelse og mange smerter. Man kan også få feber.

### Behandling:

Er der gener fra en Bartholins cyste eller -byld, kan afløbet afhjælpes fra kirtlen ved at åbne den ved et lille kirurgisk indgreb i lokal bedøvelse (eller fuld bedøvelse på sygehuset). Kirtlens kapsel vil med nogle enkelte sting, som forsvinder af sig selv, syes ud til slimhinden på kønslæbens inderside. Der er kun meget beskedne gener efter indgrebet: Lidt ømhed og lidt siven fra såret.

Vi anbefaler, at du bruger bind og skyller efter hvert toiletbesøg enten med en håndbruser eller en drikkedunk for at holde såret rent og åbent. Antibiotika er ikke nødvendig. Sygemelding er normalt heller ikke nødvendig. Gentagelsesrisikoen er meget lille.

Hvis alt ser fint ud efter 1 uge, er der ikke grund til kontrol, ellers er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan ringe til sygeplejerske Helena Graversen, 8720 6156 kl. 12.00-13.30 alle hverdage.