



Blødning ved samleje/ kontaktblødning/pletblødninger

Kontaktblødning forstås som blødning opstået efter samleje og bør altid udredes. Pletblødning er små blødninger uden for menstruationstidspunktet og bør sædvanligvis også udredes.

Årsager:

Plet- og kontaktblødning hos yngre skyldes oftest infektion eller behandling med p-piller. Chlamydiapodning foretages derfor hos egen læge. Det er ikke ualmindeligt med pletblødning på ægløsningstidspunktet. Tidligt i graviditet kan også ses pletblødninger. Hos lidt ældre kvinder ses pletblødninger og kontaktblødninger specielt ved polypper ved livmodermund og i livmoderhulen. Tynde sarte slimhinder eller betændelsesforandringer i skede eller ved livmoderhals, som ikke er betinget af seksuelt overførbare bakterier kan også være årsagen. Uanset alder vil celleforandringer og livmoderhalskræft dog også kunne være en årsag. Celleskrab fra livmoderhalsen er beregnet som en forebyggende undersøgelse og ikke som udredning, så er der kontaktblødning eller pletblødning trods forsøg på behandling, vil vi foretage en udvidet undersøgelse her.

Undersøgelser:

Hvis ikke chlamydiapodning allerede er foretaget, vil dette foretages. Undersøgelse for betændelse i skede og livmodermund udføres umiddelbart under mikroskop. For udredning af evt. celleforandringer foretages kikkertundersøgelse og prøvetagning. Link: [Se Celleforandringer](#). Vi vil også foretage en ultralydsundersøgelse.

Behandling:

Ved akutte betændelsesforandringer gives antibiotika. Ved kroniske betændelsesforandringer kan vi evt. (link) [Frysebehandle](#). Ser vi polypper ved livmoderhalsen, fjernes disse nemt oftest helt uden nødvendig bedøvelse. Er der polypper i livmoderhulen, kan disse fjernes via en kikkert. Ved celleforandringer foretages (link) [Keglesnit](#) afhængig af sværhedsgraden.