



## Frysebehandling af livmoderhalsen (kryo-behandling)

### Årsager:

Symptomer som kan lede til, at vi vil tilbyde frysebehandling, vil typisk være kroniske betændelsesforandringer i livmoderhalsen, som giver blødning i forbindelse med samleje eller flådgener.

### Behandling:

Ved frysebehandling foretages en overfladisk frysning i 2 gange 3 minutter med ca. 2 minutters optøning imellem.

Ved første frysning vil der typisk være lidt menstruationslignende smerter, men anden gang der fryses, vil smerterne oftest være mindre, da frosten alene virker bedøvende. Der kan være nogen varmekølelse i kinderne. Der er ikke risiko for underlivsbetændelse eller blærebetændelse ved behandlingen.

Enkelte vil have brug for Panodil som smertestillende.

Efter frysningen kan der de næste ca. 3-4 uger være vandtyndt evt. lidt blodigt udflåd, betinget af afstødelse af det døde væv fra livmoderhalsens overflade. Lugten kan være sødlig, men er ikke udtryk for en infektion.

I perioden bør man ikke bruge tampon, ikke havbade eller karbade og ved samleje tilrådes brug af kondom pga. øget risiko for infektion.

### Efterkontrol:

Oftest vil vi anbefale kontrol med celleskrab her eller hos egen læge efter ½ -1 år.