



Patientinformation ved rus med Midazolam/ Dormicum

Sådan skal du forberede dig

Du må ikke indtage fast føde eller mælkeholdige fødevarer fra midnat, men du må meget gerne hjemme om morgenen, inden du møder ind kl. 9, indtage sukkerholdig saft, the og kaffe. Som smertestillende tages ca. ½-1 time før fremmøde 1 g Pamol/Panodil + 400 mg Ibumetin/Ipren. Tag gerne en madpakke med.

Hvordan gives medicinen:

Medicinen gives direkte i en åre via en venflon.

Hvordan virker medicinen?

- Du slapper af og bliver mindre ængstelig.
- Ofte glemmer du helt selve behandlingen.
- Midlet virker afslappende på muskulaturen
- Du er vågen eller sover ganske let, men trækker vejret normalt og har bevaret alle reflekser, og du vil reagere på tiltale og kan føle berøring.

Kan der være bivirkninger til medicinen?

Ja, der ses lejlighedsvist bivirkninger i form af:

- svimmelhed
- dobbeltsyn
- hikke
- påvirkning af vejtrækningen (meget meget sjældent)
- stoffet er vanedannende ved misbrug

Hvor længe virker medicinen?

Medicinens virkning aftager betydeligt i løbet af ½ - 1 time efter afsluttet behandling. I dette tidsrum vil vi overvåge dig bl.a. med et apparat, der måler puls og vejtrækning. Når virkningen er aftaget så meget, at

du reagerer helt normalt, kan du tage hjem med din ledsagende chauffør. Virkningen er først fuldstændig aftaget efter nogle timer.

Derfor er det vigtigt, at:

- du er sammen med en voksen i min. 12 timer efter rusen, og at du ikke fører bil indtil 24 timer efter rusen.
- Hvis du får vejtrækningsbesvær eller på anden måde får det ubehageligt, skal du kontakte vagtlægen og fortælle, at du har fået Midazolam hos speciallæge.

Samtykke (Tilladelse til at få en rus):

Gives senest mundtligt ved ankomst på stuen.