



## Valg af abortmetode

Abort kan foretages ved en medicinsk behandling eller ved et kirurgisk indgreb.

Den medicinske behandling foregår hjemme indtil uge 8+6, herefter foregår den på sygehuset.

### Fælles for begge metoder

Ved 1.konsultation udføres en almindelig underlivsundersøgelse, og du bliver ultralydsscannet. Der tages evt. en blodprøve, hvis du er længere end uge 8+0. Hvis du ikke er chlamydiapodet hos din egen læge, gøres det her.

### Kirurgisk abort

En kirurgisk abort foregår i klinikken i lokal bedøvelse og lidt afslappende medicin eller på sygehuset i fuld bedøvelse. Livmoderhalsen udvides og et sug indføres. Herigennem fjernes graviditeten. Indgrebet varer under 10 minutter.

Efterfølgende vil du skulle slappe af her i klinikken i ca. 1 time. Du vil få smertestillende medicin, hvis du har brug for det. Herefter kan du tage hjem, hvis du har en voksen person til at ledsage dig og være hos dig til minimum samme aften.

Blødningen er oftest mindre end ved en normal

menstruation og varer som regel en lille uge.

### Medicinsk abort

Ved den medicinske abortmetode fremkaldes aborten ved, at du tager abortpiller. En til to dage senere lægger du fire stikpiller op i skeden.

Datoerne for behandlingen planlægges ved 1. konsultation. Ofte vil det være muligt at starte allerede på dagen, hvor undersøgelsen foregår. Her indtager du abortpillerne. De færreste kvinder mærker noget til abortpillerne. Abortpillerne gør, at livmoderen ikke reagerer på kroppens eget graviditetsbevarende hormon. Det resulterer i, at graviditeten går i stå.

Efter to dage oplægger du til et aftale tidspunkt to til fire stikpiller i skeden, som fremkalder sammen- trækninger i livmoderen.

Der går normalt nogle timer før graviditeten udstødes. Du får medicin mod smerter. Blødningen efter aborten vil være kraftigere og vare længere end en almindelig menstruation, det vil sige 1-2 (evt. 3) uger.

	<b>Kirurgisk abort</b>	<b>Medicinsk abort</b>
Fordele	Det er hurtigt overstået	Risikoen for infektion er meget lille. Du kan have en pårørende med
Ulemper	Skader på livmoderen kan forekomme i sjældne tilfælde. Der er en lille risiko for infektion.	Aborten tager længere tid. Du kan få bivirkninger såsom kvalme, opkastninger, diarre. Blødningen er kraftigere og længere end efter en kirurgisk abort. Ganske få behandlingssvigt kan gøre det nødvendigt at lave en udskrabning.